

## Giovane del 1° anno (fase 1.1)



Fase	1.1
Descrizione	Giovane 1° anno
Iride	Marrone o marrone chiaro
Muta delle piume di volo	No
Testa	Nera
Collo	Nero
Sagoma	Massiccia
Triangolo dorsale	Bianco
Colorazione delle copritrici alaris	Marrone o marrone con piume bianche

- Sagoma in volo massiccia, non presenta muta (remiganti secondarie appuntite). Ali arrotondate e larghe. Coda corta e con base a contatto delle remiganti secondarie.
- Testa e collo neri, ventre marrone.
- Parte superiore del dorso in genere con scudo bianco a forma di V molto visibile.
- Schiena marrone, copritrici marroni talvolta miste a piume bianche.
- Piumaggio del petto e dei tarsi con punteggiature.
- Barba molto piccola.


## Giovane del 2° anno (fase 1.2)



Fase	1.2
Descrizione	Giovane 2° anno
Iride	Bianco-giallastro
Muta delle piume di volo	Inizia alle remiganti primarie interne
Testa	Nera
Collo	Nero
Sagoma	Massiccia
Triangolo dorsale	Bianco meno evidente
Colorazione delle copritrici alaris	Marrone o marrone con piume bianche

- Sagoma in volo ancora massiccia, presenza di muta alle remiganti primarie interne.
- Testa e collo neri somiglianti ad un “cappuccio”, in forte contrasto con il ventre marrone.
- Lo scudo dorsale inizia ad essere meno visibile.
- Dorso marrone, copritrici marrone, talvolta miste a piume bianche.
- Le punteggiature sul petto sono ancora presenti, mentre quelle sui tarsi sono scomparse.
- Inizia la muta delle timoniere.

## *Immaturato del 3° anno (fase 2.1)*



Fase	2.1
Descrizione	Immaturato 3° anno
Iride	Bianco-giallastro
Muta delle piume di volo	Remiganti secondarie
Testa	Nera con piume chiare
Collo	Nero
Sagoma	Bordo delle ali irregolare
Triangolo dorsale	No
Colorazione delle copritrici alaris	Marrone/beige

- Sagoma in volo di aspetto irregolarmente dentellato (piume vecchie appuntite, più lunghe; piume nuove arrotondate, più corte), caratterizzata dall'inizio della muta alle remiganti secondarie.
- Testa e collo neri, in forte contrasto con il ventre marrone. Sulla fronte possono comparire le prime piume bianche e la barba è più evidente.
- Lo scudo dorsale non si distingue più e la colorazione del dorso diventa più omogenea.
- Dorso marrone, copritrici marrone, talvolta inframmezzate da piume bianche.
- Prosegua la muta delle timoniere.


## Subadulto del 4<sup>o</sup> anno (fase 2.2)



Fase	2.2
Descrizione	Subadulto 4 <sup>o</sup> anno
Iride	Bianco-giallastro
Muta delle piume di volo	Variabile
Testa	Bianca o rosata
Collo	Nero
Sagoma	Ali lunghe e sottili
Triangolo dorsale	No
Colorazione delle copritrici alaris	Marrone/beige

- Sagoma snella come quella dell'adulto, con presenza frequente di muta ben visibile alle remiganti primarie esterne. Ali strette ed appuntite, coda lunga.
- Le piume della fronte sono bianche e la parte superiore della testa è diventata più chiara (le piume nere spariscono progressivamente). Si può notare la macchia auricolare. E' ancora visibile il collo nero (resti di piume del "cappuccio" dell'immaturo).
- La colorazione marrone del dorso è omogenea, le copritrici possono essere miste a piume bianche.

## *Adulto imperfetto 5° - 6° anno (fase 2.3)*



Fase	2.3
Descrizione	Adulto imperfetto 5° - 6° anno
Iride	Bianco-giallastro
Muta delle piume di volo	Variabile
Testa	Bianca o rosata
Collo	Bianco o rossiccio
Sagoma	Ali lunghe e sottili
Triangolo dorsale	No
Colorazione delle copritrici alaris	Nero con piume marroni

- Sagoma snella e piumaggio di colore non uniforme per la presenza contemporanea di piume marroni e grigio ardesia, tipiche dell'adulto.
- Restano comunque ancora delle piume scure nella zona del ventre e del collo.
- Presenza di un collare spesso più esteso che nell'adulto e talvolta non molto netto.
- La parte inferiore del corpo non presenta però ancora contrasto tra il nero delle copritrici e il grigio delle remiganti.

## Adulto > 7 anni (fase 3)



Fase	3
Descrizione	Adulto >7 anni
Iride	Bianco-giallastro
Muta delle piume di volo	Variabile
Testa	Bianca o rosata
Collo	Bianco o rossiccio
Sagoma	Ali lunghe e sottili
Triangolo dorsale	No
Colorazione delle copritrici alaris	Nero

- La sagoma in volo è snella e slanciata, ali strette e coda lunga.
- La colorazione della testa varia dal bianco all'arancio.
- Presenza frequente di un collare sottile più o meno chiuso e netto sul petto.
- Le piume del dorso sono grigio ardesia o sembrano nere; il contrasto con il rachide bianco è visibile da vicino.
- La parte inferiore delle ali presenta un contrasto tra l'aspetto nero delle copritrici e il grigio delle primarie.